


Rehydratatie van het kalf met diarree zonder de melk te stoppen





BOVIFERM® PLUS^{SID}

De formule « 5 in 1 »
voor kalveren met diarree

BOVIFERM® PLUS^{SID} is een ideaal dieet maaltijdzakje samengesteld volgens de laatste wetenschappelijke verworvenheden en waardoor een samenbundeling van 5 acties ontstaat nl

COMPONENTEN	⇒	ACTIE
Electrolyten en dextrose	1	Helpt de rehydratie en verschaft energie
Bufferende substanties (citraat)	2	Beperking van de acidose
Melkzuurvormende bacterien (Oralin®)	3	Stabilisatie van de intestinale flora
Plantaardige slijmen en pectines	4	Bescherming van de intestinale mucosa
Minerale en plantaardige opnamestoffen	5	Binding van de toxines

Door deze unieke samenstelling is **Boviferm® plus^{SID}** een optimaal voedingssupplement voor kalveren met diarree.

Boviferm® plus^{SID} remt de stremming van de melk in de lebmaag niet, noch de melkverteerbaarheid en kan daardoor te samen met de melk of melkvervangers toegediend worden. Tevens wordt de eetlust verhoogd.

Vroegtijdige toediening van **Boviferm® plus^{SID}** zonder de melkmaaltijden te stoppen verzekert de groei en verlaagt de sterfte.

1 zakje van **Boviferm® plus^{SID}** opgelost in 2 liter verschaft 222 mmol Na⁺, 50 mmol K⁺, 118 mmol Cl⁻, 244 mmol glucose, 308 mmol bufferende substanties en 2 miljard herlevende *Enterococcus faecium* kiemen.

Boviferm® plus^{SID} geeft aan de kalveren electrolyten, bufferende substanties, melkzuurvormende bacteriën, vloeibare gom, ballaststoffen en andere producten nodig voor de rehydratie.

Ingrediënten :

Dextrose, melkpoeder, natrium-propionate, potentilla erecta, natriumchloride, kaliumchloride bananenvlokken, rijstmeel, poeder van kamille, anijs, venkel, calciumchloride, magnesiumchloride.

Samenstelling:

Ruw eiwit: 4,0%; Ruwe celstof: 1,4%;
Ruw vet: 0,5%; Ruwe as: 21,0%; Natrium: 4,4%;
Kalium: 1,7%; Chloride: 3,8%

Toevoegingsmiddelen per kg:

Vit A: 175 000 IE; Vit E: 440 mg; Magnesiumchloride, magnesium: 2.000 mg; Bentonite-montmorillonite; Guarmeel;
Enterococcus faecium NCIB 10415 (E1701) (ORALIN) 1,75x10¹⁰ kiemen.

Voedingsdoel: Stabilisatie van water en electrolytenhuishouding.

Gebruiksaanwijzing:

Bij dreigende darmstoornissen (diarree), gedurende en daarna: Tweemaal per dag 1 zakje (115 g) van **Boviferm® plus^{SID}** in 2 liter water en 0,5 tot 4 liter melk of melkvervanger bijvoegen naargelang het totale volume dat nodig is voor het kalf.

Boviferm® plus^{SID} wordt tweemaal per dag gegeven tot het einde van de diarree.

Bijzondere aanbeveling:

Boviferm® plus^{SID} bevat melkzuurvormende bacteriën; de temperatuur van het mengsel mag daarom de 50°C niet overschrijden.

Bewaring: 18 maanden. Buiten invloed van warmte en vochtigheid.

Presentatie: Doos met 24 zakjes van 115g

